Chapitre 2: Théorème des accroissements finis

A. ELBOUR

Faculté des Sciences et Techniques
Errachidia

2022-2023

Plan

- 1 Théorème des accroissements finis lorsque la variable est réelle
- 2 Théorème des accroissements finis lorsque la variable est dans un e.v.n
- 3 Application du théorème des accroissements finis

Soient a et b deux points de $\mathbb{R}$ tels que $a < b$. Si $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, le théorème classique des accroissements finis dit qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = (b - a)f'(c).$$

Ce résultat ne subsiste pas si l'application f est à valeurs dans un e.v.n réel E de dimension supérieur ≥ 2 . Il suffit pour s'en convaincre de considérer l'application

$$f : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad t \longmapsto (\cos t, \sin t);$$

on a $f(2\pi) = f(0)$ mais il n'existe aucun $c \in]0, 2\pi[$ tel que $f(2\pi) - f(0) = (2\pi - 0)f'(c)$.

Il est cependant très important pour les applications de pouvoir donner une majoration précise et simple de $\|f(b) - f(a)\|$ connaissant une majoration de $\|f'(x)\|$ sur $]a, b[$; et nous allons établir un théorème plus général. Avant de l'énoncer, il faut donner une définition.

Soient a et b deux points de $\mathbb{R}$ tels que $a < b$. Si $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, le théorème classique des accroissements finis dit qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = (b - a)f'(c).$$

Ce résultat ne subsiste pas si l'application f est à valeurs dans un e.v.n réel E de dimension supérieur ≥ 2 . Il suffit pour s'en convaincre de considérer l'application

$$f : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad t \longmapsto (\cos t, \sin t);$$

on a $f(2\pi) = f(0)$ mais il n'existe aucun $c \in]0, 2\pi[$ tel que $f(2\pi) - f(0) = (2\pi - 0)f'(c)$.

Il est cependant très important pour les applications de pouvoir donner une majoration précise et simple de $\|f(b) - f(a)\|$ connaissant une majoration de $\|f'(x)\|$ sur $]a, b[$; et nous allons établir un théorème plus général. Avant de l'énoncer, il faut donner une définition.

Soient a et b deux points de $\mathbb{R}$ tels que $a < b$. Si $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, le théorème classique des accroissements finis dit qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = (b - a)f'(c).$$

Ce résultat ne subsiste pas si l'application f est à valeurs dans un e.v.n réel E de dimension supérieur ≥ 2 . Il suffit pour s'en convaincre de considérer l'application

$$f : [0, 2\pi] \longrightarrow \mathbb{R}^2 \quad t \longmapsto (\cos t, \sin t);$$

on a $f(2\pi) = f(0)$ mais il n'existe aucun $c \in]0, 2\pi[$ tel que $f(2\pi) - f(0) = (2\pi - 0)f'(c)$.

Il est cependant très important pour les applications de pouvoir donner une majoration précise et simple de $\|f(b) - f(a)\|$ connaissant une majoration de $\|f'(x)\|$ sur $]a, b[$; et nous allons établir un théorème plus général. Avant de l'énoncer, il faut donner une définition.

Définition

Soient a et b deux points de $\mathbb{R}$ tels que $a < b$. On dit qu'une application $f : [a, b] \rightarrow F$ admet une dérivée à droite en un point $t_0 \in [a, b[$ si

$$\lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t > t_0}} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}$$

existe ; cette limite se note alors $f'_d(t_0)$ et s'appelle la dérivée à droite de f au point t_0 . [Voir note 1](#)

On définit de même, si elle existe, la dérivée à gauche de f en un point $t_0 \in]a, b]$:

$$f'_g(t_0) = \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t < t_0}} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}.$$

Pour qu'une fonction $f : [a, b] \rightarrow F$ admette une dérivée $f'(t_0)$ en un point $t_0 \in]a, b[$, il faut et il suffit que $f'_d(t_0)$ et $f'_g(t_0)$ existent, et soient égales.

Définition

Soient a et b deux points de $\mathbb{R}$ tels que $a < b$. On dit qu'une application $f : [a, b] \rightarrow F$ admet une dérivée à droite en un point $t_0 \in [a, b[$ si

$$\lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t > t_0}} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}$$

existe ; cette limite se note alors $f'_d(t_0)$ et s'appelle la dérivée à droite de f au point t_0 . [Voir note 1](#)

On définit de même, si elle existe, la dérivée à gauche de f en un point $t_0 \in]a, b]$:

$$f'_g(t_0) = \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t < t_0}} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}.$$

Pour qu'une fonction $f : [a, b] \rightarrow F$ admette une dérivée $f'(t_0)$ en un point $t_0 \in]a, b[$, il faut et il suffit que $f'_d(t_0)$ et $f'_g(t_0)$ existent, et soient égales.

Définition

Soient a et b deux points de $\mathbb{R}$ tels que $a < b$. On dit qu'une application $f : [a, b] \rightarrow F$ admet une dérivée à droite en un point $t_0 \in [a, b[$ si

$$\lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t > t_0}} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}$$

existe ; cette limite se note alors $f'_d(t_0)$ et s'appelle la dérivée à droite de f au point t_0 . [Voir note 1](#)

On définit de même, si elle existe, la dérivée à gauche de f en un point $t_0 \in]a, b]$:

$$f'_g(t_0) = \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t < t_0}} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}.$$

Pour qu'une fonction $f : [a, b] \rightarrow F$ admette une dérivée $f'(t_0)$ en un point $t_0 \in]a, b[$, il faut et il suffit que $f'_d(t_0)$ et $f'_g(t_0)$ existent, et soient égales.

Théorème (fondamental)

Soient a et b deux points de $\mathbb{R}$ tels que $a < b$, F un espace vectoriel normé. Soient $f : [a, b] \rightarrow F$ et $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux applications continues sur $[a, b]$.

On suppose que f et g possèdent des dérivées à droite en chaque point x de l'intervalle ouvert $]a, b[$ vérifiant l'inégalité

$$\|f'_d(x)\| \leq g'_d(x), \quad \forall x \in]a, b[.$$

Alors on a

$$\|f(b) - f(a)\| \leq g(b) - g(a).$$

Démonstration.

Nous allons prouver que pour tout sous-intervalle $[u, v]$ de $]a, b[$ on a

$$\|f(v) - f(u)\| \leq g(v) - g(u). \quad (1)$$

En faisant tendre u vers a et v vers b et en tenant compte de la continuité de f et g , on obtient

$$\|f(b) - f(a)\| \leq g(b) - g(a).$$

Soit donc $[u, v]$ un sous-intervalle de $]a, b[$ (avec $u < v$). Pour établir l'inégalité (1), il suffit de montrer que pour tout $\varepsilon > 0$ et tout $x \in [u, v]$ on a :

$$\|f(x) - f(u)\| \leq g(x) - g(u) + \varepsilon(x - u). \quad (2)$$

En effet, en appliquant l'inégalité (2) pour $x = v$, puis en faisant tendre ε vers 0, on obtiendra l'inégalité (1). □

Démonstration.

Nous allons prouver que pour tout sous-intervalle $[u, v]$ de $]a, b[$ on a

$$\|f(v) - f(u)\| \leq g(v) - g(u). \quad (1)$$

En faisant tendre u vers a et v vers b et en tenant compte de la continuité de f et g , on obtient

$$\|f(b) - f(a)\| \leq g(b) - g(a).$$

Soit donc $[u, v]$ un sous-intervalle de $]a, b[$ (avec $u < v$). Pour établir l'inégalité (1), il suffit de montrer que pour tout $\varepsilon > 0$ et tout $x \in [u, v]$ on a :

$$\|f(x) - f(u)\| \leq g(x) - g(u) + \varepsilon(x - u). \quad (2)$$

En effet, en appliquant l'inégalité (2) pour $x = v$, puis en faisant tendre ε vers 0, on obtiendra l'inégalité (1). □

Démonstration.

Soit donc $\varepsilon > 0$ donné, et soit I_ε l'ensemble des points $x \in [u, v]$ pour lesquels on a

$$\|f(t) - f(u)\| \leq g(t) - g(u) + \varepsilon(t - u), \quad \forall t \in [u, x] \quad (3)$$

Il s'agit de montrer que $I_\varepsilon = [u, v]$. Puisque l'ensemble $I_\varepsilon \subset [u, v]$ est non vide (car $u \in I_\varepsilon$) et majoré, $c = \sup I_\varepsilon$ existe, et on a $u \leq c \leq v$. Montrons d'abord que $I_\varepsilon = [u, c]$. Évidemment on a $I_\varepsilon \subset [u, c]$. Si $c = u$, le résultat est évident car dans ce cas I_ε se réduit au singleton $\{u\}$. Supposons donc $c > u$. Soit $x \in [u, c[$. Par définition de la borne supérieure, il existe $x' \in I_\varepsilon$ tel que $x < x'$. Puisque l'inégalité (3) est vraie pour tout $t \in [u, x']$, elle est aussi vraie pour tout $t \in [u, x]$. Donc $x \in I_\varepsilon$. Cela montre que $[u, c[\subset I_\varepsilon$. D'autre part, l'inégalité (3) est vraie pour chaque $t \in [u, c[$, donc aussi pour $t = c$ (puisque f et g sont continues), ce qui prouve que $c \in I_\varepsilon$. D'où $I_\varepsilon = [u, c]$. [Voir note 2](#)

Démonstration.

Soit donc $\varepsilon > 0$ donné, et soit I_ε l'ensemble des points $x \in [u, v]$ pour lesquels on a

$$\|f(t) - f(u)\| \leq g(t) - g(u) + \varepsilon(t - u), \quad \forall t \in [u, x] \quad (3)$$

Il s'agit de montrer que $I_\varepsilon = [u, v]$. Puisque l'ensemble $I_\varepsilon \subset [u, v]$ est non vide (car $u \in I_\varepsilon$) et majoré, $c = \sup I_\varepsilon$ existe, et on a $u \leq c \leq v$.

Montrons d'abord que $I_\varepsilon = [u, c]$. Évidemment on a $I_\varepsilon \subset [u, c]$. Si $c = u$, le résultat est évident car dans ce cas I_ε se réduit au singleton $\{u\}$.

Supposons donc $c > u$. Soit $x \in [u, c[$. Par définition de la borne supérieure, il existe $x' \in I_\varepsilon$ tel que $x < x'$. Puisque l'inégalité (3) est vraie pour tout $t \in [u, x']$, elle est aussi vraie pour tout $t \in [u, x]$. Donc $x \in I_\varepsilon$. Cela montre que $[u, c[\subset I_\varepsilon$.

D'autre part, l'inégalité (3) est vraie pour chaque $t \in [u, c[$, donc aussi pour $t = c$ (puisque f et g sont continues), ce qui prouve que $c \in I_\varepsilon$.

D'où $I_\varepsilon = [u, c]$. [Voir note 2](#)

Démonstration.

Soit donc $\varepsilon > 0$ donné, et soit I_ε l'ensemble des points $x \in [u, v]$ pour lesquels on a

$$\|f(t) - f(u)\| \leq g(t) - g(u) + \varepsilon(t - u), \quad \forall t \in [u, x] \quad (3)$$

Il s'agit de montrer que $I_\varepsilon = [u, v]$. Puisque l'ensemble $I_\varepsilon \subset [u, v]$ est non vide (car $u \in I_\varepsilon$) et majoré, $c = \sup I_\varepsilon$ existe, et on a $u \leq c \leq v$. Montrons d'abord que $I_\varepsilon = [u, c]$. Évidemment on a $I_\varepsilon \subset [u, c]$. Si $c = u$, le résultat est évident car dans ce cas I_ε se réduit au singleton $\{u\}$.

Supposons donc $c > u$. Soit $x \in [u, c[$. Par définition de la borne supérieure, il existe $x' \in I_\varepsilon$ tel que $x < x'$. Puisque l'inégalité (3) est vraie pour tout $t \in [u, x']$, elle est aussi vraie pour tout $t \in [u, x]$. Donc $x \in I_\varepsilon$. Cela montre que $[u, c[\subset I_\varepsilon$.

D'autre part, l'inégalité (3) est vraie pour chaque $t \in [u, c[$, donc aussi pour $t = c$ (puisque f et g sont continues), ce qui prouve que $c \in I_\varepsilon$.

D'où $I_\varepsilon = [u, c]$. [Voir note 2](#)

Démonstration.

Soit donc $\varepsilon > 0$ donné, et soit I_ε l'ensemble des points $x \in [u, v]$ pour lesquels on a

$$\|f(t) - f(u)\| \leq g(t) - g(u) + \varepsilon(t - u), \quad \forall t \in [u, x] \quad (3)$$

Il s'agit de montrer que $I_\varepsilon = [u, v]$. Puisque l'ensemble $I_\varepsilon \subset [u, v]$ est non vide (car $u \in I_\varepsilon$) et majoré, $c = \sup I_\varepsilon$ existe, et on a $u \leq c \leq v$. Montrons d'abord que $I_\varepsilon = [u, c]$. Évidemment on a $I_\varepsilon \subset [u, c]$. Si $c = u$, le résultat est évident car dans ce cas I_ε se réduit au singleton $\{u\}$. Supposons donc $c > u$. Soit $x \in [u, c[$. Par définition de la borne supérieure, il existe $x' \in I_\varepsilon$ tel que $x < x'$. Puisque l'inégalité (3) est vraie pour tout $t \in [u, x']$, elle est aussi vraie pour tout $t \in [u, x]$. Donc $x \in I_\varepsilon$. Cela montre que $[u, c[\subset I_\varepsilon$.

D'autre part, l'inégalité (3) est vraie pour chaque $t \in [u, c]$, donc aussi pour $t = c$ (puisque f et g sont continues), ce qui prouve que $c \in I_\varepsilon$.

D'où $I_\varepsilon = [u, c]$. [Voir note 2](#)

Démonstration.

Soit donc $\varepsilon > 0$ donné, et soit I_ε l'ensemble des points $x \in [u, v]$ pour lesquels on a

$$\|f(t) - f(u)\| \leq g(t) - g(u) + \varepsilon(t - u), \quad \forall t \in [u, x] \quad (3)$$

Il s'agit de montrer que $I_\varepsilon = [u, v]$. Puisque l'ensemble $I_\varepsilon \subset [u, v]$ est non vide (car $u \in I_\varepsilon$) et majoré, $c = \sup I_\varepsilon$ existe, et on a $u \leq c \leq v$. Montrons d'abord que $I_\varepsilon = [u, c]$. Évidemment on a $I_\varepsilon \subset [u, c]$. Si $c = u$, le résultat est évident car dans ce cas I_ε se réduit au singleton $\{u\}$. Supposons donc $c > u$. Soit $x \in [u, c[$. Par définition de la borne supérieure, il existe $x' \in I_\varepsilon$ tel que $x < x'$. Puisque l'inégalité (3) est vraie pour tout $t \in [u, x']$, elle est aussi vraie pour tout $t \in [u, x]$. Donc $x \in I_\varepsilon$. Cela montre que $[u, c[\subset I_\varepsilon$. D'autre part, l'inégalité (3) est vraie pour chaque $t \in [u, c[$, donc aussi pour $t = c$ (puisque f et g sont continues), ce qui prouve que $c \in I_\varepsilon$. D'où $I_\varepsilon = [u, c]$. [Voir note 2](#)

Démonstration.

Il reste donc à établir que $c = v$. Supposons $c < v$. L'existence de $f'_d(c)$ et $g'_d(c)$ entraînent celle d'un nombre $h > 0$ (auquel nous pouvons imposer de vérifier $h \leq v - c$) tel que, pour tout $t \in]c, c + h[$ on a à la fois

$$\left\| \frac{f(t) - f(c)}{t - c} - f'_d(c) \right\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{et} \quad \left| \frac{g(t) - g(c)}{t - c} - g'_d(c) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Voir note 3

En tenant compte de $\|f'_d(c)\| \leq g'_d(c)$ et en utilisant l'inégalité triangulaire, on en déduit les inégalités [Voir note 4](#)

$$\left\| \frac{f(t) - f(c)}{t - c} \right\| \leq \|f'_d(c)\| + \frac{\varepsilon}{2} \leq g'_d(c) + \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{g(t) - g(c)}{t - c} + \varepsilon,$$

Démonstration.

Il reste donc à établir que $c = v$. Supposons $c < v$. L'existence de $f'_d(c)$ et $g'_d(c)$ entraînent celle d'un nombre $h > 0$ (auquel nous pouvons imposer de vérifier $h \leq v - c$) tel que, pour tout $t \in]c, c + h[$ on a à la fois

$$\left\| \frac{f(t) - f(c)}{t - c} - f'_d(c) \right\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{et} \quad \left| \frac{g(t) - g(c)}{t - c} - g'_d(c) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Voir note 3

En tenant compte de $\|f'_d(c)\| \leq g'_d(c)$ et en utilisant l'inégalité triangulaire, on en déduit les inégalités [Voir note 4](#)

$$\left\| \frac{f(t) - f(c)}{t - c} \right\| \leq \|f'_d(c)\| + \frac{\varepsilon}{2} \leq g'_d(c) + \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{g(t) - g(c)}{t - c} + \varepsilon,$$

Démonstration.

d'où

$$\|f(t) - f(c)\| \leq g(t) - g(c) + \varepsilon(t - c);$$

et puisque $c \in I_\varepsilon$,

$$\|f(c) - f(u)\| \leq g(c) - g(u) + \varepsilon(c - u).$$

Donc :

$$\|f(t) - f(u)\| \leq g(t) - g(u) + \varepsilon(t - u);$$

pour tout $t \in]c, c + h]$ (et par suite pour tout $t \in [u, c + h]$), ce qui montre que $c + h \in I_\varepsilon$, ce qui contredit le fait que $c = \sup I_\varepsilon$. On a donc $c = v$.

Cela montre que $I_\varepsilon = [u, v]$, c'est-à-dire, l'inégalité (2) est satisfaite pour tout $\varepsilon > 0$ et tout $x \in [u, v]$. □

Démonstration.

d'où

$$\|f(t) - f(c)\| \leq g(t) - g(c) + \varepsilon(t - c);$$

et puisque $c \in I_\varepsilon$,

$$\|f(c) - f(u)\| \leq g(c) - g(u) + \varepsilon(c - u).$$

Donc :

$$\|f(t) - f(u)\| \leq g(t) - g(u) + \varepsilon(t - u);$$

pour tout $t \in]c, c + h]$ (et par suite pour tout $t \in [u, c + h]$), ce qui montre que $c + h \in I_\varepsilon$, ce qui contredit le fait que $c = \sup I_\varepsilon$. On a donc $c = v$.

Cela montre que $I_\varepsilon = [u, v]$, c'est-à-dire, l'inégalité (2) est satisfaite pour tout $\varepsilon > 0$ et tout $x \in [u, v]$. □

Démonstration.

d'où

$$\|f(t) - f(c)\| \leq g(t) - g(c) + \varepsilon(t - c);$$

et puisque $c \in I_\varepsilon$,

$$\|f(c) - f(u)\| \leq g(c) - g(u) + \varepsilon(c - u).$$

Donc :

$$\|f(t) - f(u)\| \leq g(t) - g(u) + \varepsilon(t - u);$$

pour tout $t \in]c, c + h]$ (et par suite pour tout $t \in [u, c + h]$), ce qui montre que $c + h \in I_\varepsilon$, ce qui contredit le fait que $c = \sup I_\varepsilon$. On a donc $c = v$.

Cela montre que $I_\varepsilon = [u, v]$, c'est-à-dire, l'inégalité (2) est satisfaite pour tout $\varepsilon > 0$ et tout $x \in [u, v]$. □

Remarques

- ① *Sous les hypothèses du théorème 5 on a*

$$\|f(v) - f(u)\| \leq g(v) - g(u)$$

quels que soient $u, v \in [a, b]$ vérifiant $u \leq v$.

- ② *Le théorème 5 reste vraie si on y remplace les mots “dérivée à droite” par “dérivée à gauche”. Il suffit d’appliquer le théorème 5 aux fonctions $x \mapsto -f(-x)$ et $x \mapsto -g(-x)$.*

Voir note 5

Cas particuliers importants :

En prenant $f(x) = 0$ quel que soit $x \in [a, b]$, on obtient le corollaire suivant :

Corollaire

Si $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue et possède une dérivée à droite $g'_d(x) \geq 0$ pour tout $x \in]a, b[$, alors g est croissante.

Remarques

- ① *Sous les hypothèses du théorème 5 on a*

$$\|f(v) - f(u)\| \leq g(v) - g(u)$$

quels que soient $u, v \in [a, b]$ vérifiant $u \leq v$.

- ② *Le théorème 5 reste vraie si on y remplace les mots “dérivée à droite” par “dérivée à gauche”. Il suffit d’appliquer le théorème 5 aux fonctions $x \mapsto -f(-x)$ et $x \mapsto -g(-x)$.*

Voir note 5

Cas particuliers importants :

En prenant $f(x) = 0$ quel que soit $x \in [a, b]$, on obtient le corollaire suivant :

Corollaire

Si $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue et possède une dérivée à droite $g'_d(x) \geq 0$ pour tout $x \in]a, b[$, alors g est croissante.

En prenant $g(x) = kx$ (k étant une constante positive), on obtient le résultat suivant :

Corollaire

Soit $f : [a, b] \rightarrow F$ une application continue sur $[a, b]$ dans un e.v.n F , admettant en chaque point $x \in]a, b[$ une dérivée à droite vérifiant $\|f'_d(x)\| \leq k$, alors on a :

$$\|f(b) - f(a)\| \leq k(b - a)$$

et, plus généralement :

$$\|f(x) - f(y)\| \leq k|x - y|$$

quels que soient $x, y \in [a, b]$.

En particulier, si $k = 0$ dans le corollaire 11, on obtient :

Corollaire

Soit $f : [a, b] \longrightarrow F$ une application continue sur $[a, b]$ dans un e.v.n F , admettant en chaque point $x \in]a, b[$ une dérivée à droite nulle. Alors f est constante sur $[a, b]$.

Plan

- 1 Théorème des accroissements finis lorsque la variable est réelle
- 2 Théorème des accroissements finis lorsque la variable est dans un e.v.n**
- 3 Application du théorème des accroissements finis

Définition

Soient a et b deux points d'un e.v.n E . On appelle segment d'extrémités a et b , et on note $[a, b]$, l'ensemble des points $z \in E$ de la forme

$$z = (1 - t)a + tb, \text{ avec } 0 \leq t \leq 1.$$

En d'autres termes, $[a, b] = \{a + t(b - a); 0 \leq t \leq 1\}$.

Une partie A de E est dite convexe si pour tous $a, b \in A$ on a $[a, b] \subset A$.

Théorème

Soient E et F deux espaces vectoriels normés, U un ouvert de E , et $f : U \rightarrow F$ une application différentiable sur U . Si a et b sont deux points de U tels que le segment $[a, b]$ est contenu dans U , alors on a

$$\|f(b) - f(a)\| \leq \|b - a\| \cdot \sup_{z \in [a, b]} \|Df(z)\|.$$

Définition

Soient a et b deux points d'un e.v.n E . On appelle segment d'extrémités a et b , et on note $[a, b]$, l'ensemble des points $z \in E$ de la forme

$$z = (1 - t)a + tb, \text{ avec } 0 \leq t \leq 1.$$

En d'autres termes, $[a, b] = \{a + t(b - a); 0 \leq t \leq 1\}$.

Une partie A de E est dite convexe si pour tous $a, b \in A$ on a $[a, b] \subset A$.

Théorème

Soient E et F deux espaces vectoriels normés, U un ouvert de E , et $f : U \rightarrow F$ une application différentiable sur U . Si a et b sont deux points de U tels que le segment $[a, b]$ est contenu dans U , alors on a

$$\|f(b) - f(a)\| \leq \|b - a\| \cdot \sup_{z \in [a, b]} \|Df(z)\|.$$

Démonstration.

Soit $\phi : [0, 1] \rightarrow F$ la fonction définie par $\phi(t) = f(a + t(b - a))$. C'est une fonction continue sur $[0, 1]$, dérivable sur $]0, 1[$, et d'après la proposition 1.13 on a

$$\phi'(t) = Df(a + t(b - a))(b - a),$$

d'où

$$\begin{aligned} \|\phi'(t)\| &= \|Df(a + t(b - a))(b - a)\| \\ &\leq \|Df(a + t(b - a))\| \cdot \|b - a\| \\ &\leq \|b - a\| \cdot \sup_{z \in [a, b]} \|Df(z)\|. \end{aligned}$$

Démonstration.

En appliquant à ϕ le corollaire 11, on obtient

$$\|\phi(1) - \phi(0)\| \leq \left(\|b - a\| \cdot \sup_{z \in [a,b]} \|Df(z)\| \right) \cdot (1 - 0),$$

c'est-à-dire,

$$\|f(b) - f(a)\| \leq \|b - a\| \cdot \sup_{z \in [a,b]} \|Df(z)\|.$$

Démonstration.

En appliquant à ϕ le corollaire 11, on obtient

$$\|\phi(1) - \phi(0)\| \leq \left(\|b - a\| \cdot \sup_{z \in [a,b]} \|Df(z)\| \right) \cdot (1 - 0),$$

c'est-à-dire,

$$\|f(b) - f(a)\| \leq \|b - a\| \cdot \sup_{z \in [a,b]} \|Df(z)\|.$$

Supposons maintenant que l'ouvert U soit convexe, c'est-à-dire que, pour tout couple (a, b) de points de U , le segment $[a, b]$ soit contenu dans U .

Théorème

Soit U un **ouvert convexe** d'un e.v.n E , et soit $f : U \rightarrow F$ une application différentiable à valeurs dans un e.v.n F . Supposons qu'il existe $k \geq 0$ tel que

$$\|Df(x)\| \leq k \text{ pour tout } x \in U.$$

Alors, quels que soient $x, y \in U$, on a

$$\|f(x) - f(y)\| \leq k\|x - y\|.$$

Autrement dit la fonction f est k -lipschitzienne.

Supposons maintenant que l'ouvert U soit convexe, c'est-à-dire que, pour tout couple (a, b) de points de U , le segment $[a, b]$ soit contenu dans U .

Théorème

Soit U un **ouvert convexe** d'un e.v.n E , et soit $f : U \rightarrow F$ une application différentiable à valeurs dans un e.v.n F . Supposons qu'il existe $k \geq 0$ tel que

$$\|Df(x)\| \leq k \text{ pour tout } x \in U.$$

Alors, quels que soient $x, y \in U$, on a

$$\|f(x) - f(y)\| \leq k\|x - y\|.$$

Autrement dit la fonction f est k -lipschitzienne.

Corollaire

Sous les hypothèses précédentes, supposons que $k = 0$, c'est-à-dire que $Df(x) = 0$ pour tout $x \in U$. Alors f est constante dans U .

On va voir maintenant que ce corollaire est, en réalité, valable non seulement si U est convexe, mais plus généralement si U est connexe. Rappelons qu'un espace topologique X est dit connexe si, chaque fois que X est une réunion de deux ouverts disjoints, l'un d'eux est vide (et l'autre est X).

Théorème

*Soit U un **ouvert connexe** d'un e.v.n E , et soit $f : U \rightarrow F$ une application différentiable sur U à valeurs dans un e.v.n F . Si la dérivée $Df(x) = 0$ pour tout $x \in U$, alors f est constante.*

Corollaire

Sous les hypothèses précédentes, supposons que $k = 0$, c'est-à-dire que $Df(x) = 0$ pour tout $x \in U$. Alors f est constante dans U .

On va voir maintenant que ce corollaire est, en réalité, valable non seulement si U est convexe, mais plus généralement si U est connexe. Rappelons qu'un espace topologique X est dit connexe si, chaque fois que X est une réunion de deux ouverts disjoints, l'un d'eux est vide (et l'autre est X).

Théorème

*Soit U un **ouvert connexe** d'un e.v.n E , et soit $f : U \rightarrow F$ une application différentiable sur U à valeurs dans un e.v.n F . Si la dérivée $Df(x) = 0$ pour tout $x \in U$, alors f est constante.*

Corollaire

Sous les hypothèses précédentes, supposons que $k = 0$, c'est-à-dire que $Df(x) = 0$ pour tout $x \in U$. Alors f est constante dans U .

On va voir maintenant que ce corollaire est, en réalité, valable non seulement si U est convexe, mais plus généralement si U est connexe. Rappelons qu'un espace topologique X est dit connexe si, chaque fois que X est une réunion de deux ouverts disjoints, l'un d'eux est vide (et l'autre est X).

Théorème

*Soit U un **ouvert connexe** d'un e.v.n E , et soit $f : U \rightarrow F$ une application différentiable sur U à valeurs dans un e.v.n F . Si la dérivée $Df(x) = 0$ pour tout $x \in U$, alors f est constante.*

Corollaire

Sous les hypothèses précédentes, supposons que $k = 0$, c'est-à-dire que $Df(x) = 0$ pour tout $x \in U$. Alors f est constante dans U .

On va voir maintenant que ce corollaire est, en réalité, valable non seulement si U est convexe, mais plus généralement si U est connexe. Rappelons qu'un espace topologique X est dit connexe si, chaque fois que X est une réunion de deux ouverts disjoints, l'un d'eux est vide (et l'autre est X).

Théorème

*Soit U un **ouvert connexe** d'un e.v.n E , et soit $f : U \rightarrow F$ une application différentiable sur U à valeurs dans un e.v.n F . Si la dérivée $Df(x) = 0$ pour tout $x \in U$, alors f est constante.*

Démonstration.

Soit $x_0 \in U$ fixé. Considérons l'ensemble

$$D = \{x \in U \mid f(x) = f(x_0)\}.$$

Montrons d'abord que D est un ouvert. Soit $x \in D$. Puisque U est un ouvert, il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset U$. Pour tout $y \in B(x, r)$ on a $[x, y] \subset B(x, r) \subset U$, donc d'après le théorème 14 on a

$$f(y) = f(x).$$

Or $f(x) = f(x_0)$ (car $x \in D$). Donc $f(y) = f(x_0)$. D'où $y \in D$. Par suite $B(x, r) \subset D$. Cela montre que D est un ouvert. □

Démonstration.

Soit $x_0 \in U$ fixé. Considérons l'ensemble

$$D = \{x \in U \mid f(x) = f(x_0)\}.$$

Montrons d'abord que D est un ouvert. Soit $x \in D$. Puisque U est un ouvert, il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset U$. Pour tout $y \in B(x, r)$ on a $[x, y] \subset B(x, r) \subset U$, donc d'après le théorème 14 on a

$$f(y) = f(x).$$

Or $f(x) = f(x_0)$ (car $x \in D$). Donc $f(y) = f(x_0)$. D'où $y \in D$. Par suite $B(x, r) \subset D$. Cela montre que D est un ouvert. □

Démonstration.

Soit $x_0 \in U$ fixé. Considérons l'ensemble

$$D = \{x \in U \mid f(x) = f(x_0)\}.$$

Montrons d'abord que D est un ouvert. Soit $x \in D$. Puisque U est un ouvert, il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset U$. Pour tout $y \in B(x, r)$ on a $[x, y] \subset B(x, r) \subset U$, donc d'après le théorème 14 on a

$$f(y) = f(x).$$

Or $f(x) = f(x_0)$ (car $x \in D$). Donc $f(y) = f(x_0)$. D'où $y \in D$. Par suite $B(x, r) \subset D$. Cela montre que D est un ouvert. □

Démonstration.

Mais puisque f est continue, son complémentaire

$$V = U \setminus D = \{x \in U \mid f(x) \neq f(x_0)\}$$

est aussi un ouvert (comme image réciproque de l'ouvert $F \setminus \{f(x_0)\}$).

On a

$$U = D \cup V \quad \text{et} \quad D \cap V = \emptyset.$$

Or D est non vide, car $x_0 \in D$. Donc si V était non vide, on aurait une partition de U en deux ouverts non vides, et U ne serait pas connexe, contrairement à l'hypothèse. D'où $V = \emptyset$ et $D = U$, et par suite pour tout $x \in U$ on a $f(x) = f(x_0)$. Cela montre que f est constante. $\square$

Théorème

Soient E un e.v.n, U un ouvert de E , et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une **fonction numérique** différentiable sur U . Si a et b sont deux points distincts de U tels que le segment $[a, b]$ soit contenu dans U , alors il existe $c \in]a, b[$ avec

$$f(b) - f(a) = Df(c)(b - a) \quad (4)$$

Démonstration.

Soit $\phi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction numérique définie par

$$\phi(t) = f(a + t(b - a)).$$

Elle est continue sur $[0, 1]$, dérivable sur $]0, 1[$ et on a

$$\phi'(t) = Df(a + t(b - a))(b - a). \quad \square$$

Théorème

Soient E un e.v.n, U un ouvert de E , et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une **fonction numérique** différentiable sur U . Si a et b sont deux points distincts de U tels que le segment $[a, b]$ soit contenu dans U , alors il existe $c \in]a, b[$ avec

$$f(b) - f(a) = Df(c)(b - a) \quad (4)$$

Démonstration.

Soit $\phi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction numérique définie par

$$\phi(t) = f(a + t(b - a)).$$

Elle est continue sur $[0, 1]$, dérivable sur $]0, 1[$ et on a

$$\phi'(t) = Df(a + t(b - a))(b - a). \quad \square$$

Théorème

Soient E un e.v.n, U un ouvert de E , et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une **fonction numérique** différentiable sur U . Si a et b sont deux points distincts de U tels que le segment $[a, b]$ soit contenu dans U , alors il existe $c \in]a, b[$ avec

$$f(b) - f(a) = Df(c)(b - a) \quad (4)$$

Démonstration.

Soit $\phi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction numérique définie par

$$\phi(t) = f(a + t(b - a)).$$

Elle est continue sur $[0, 1]$, dérivable sur $]0, 1[$ et on a

$$\phi'(t) = Df(a + t(b - a))(b - a).$$

Démonstration.

Donc d'après le théorème classique des accroissements finis il existe un nombre réel $\theta \in]0, 1[$ tel que

$$\phi(1) - \phi(0) = \phi'(\theta),$$

c'est-à-dire,

$$f(b) - f(a) = Df(c)(b - a),$$

avec $c = a + \theta(b - a) \in]a, b[$. □

Remarque

Si $E = \mathbb{R}^n$, la relation (4) s'écrit :

$$f(b) - f(a) = \sum_{i=1}^n (b_i - a_i) \frac{\partial f}{\partial x_i}(c).$$

avec $a = (a_1, \dots, a_n) \in U$ et $b = (b_1, \dots, b_n) \in U$. L'intérêt de cette relation vient de ce que les n dérivées partielles qui y figurent sont prises au même point c .

Plan

- 1 Théorème des accroissements finis lorsque la variable est réelle
- 2 Théorème des accroissements finis lorsque la variable est dans un e.v.n
- 3 Application du théorème des accroissements finis

Nous sommes maintenant en mesure de démontrer la proposition 1.19.

Proposition

Soient $E_1, \dots, E_n$ des espaces vectoriels normés, et soit $E = E_1 \times \dots \times E_n$. Soit $f : U \rightarrow F$ une application d'un ouvert U de E à valeurs dans un e.v.n F . Si les n différentielles partielles $D_i f(x)$ existent en tout point $x \in U$, et si les applications $D_i f : U \rightarrow \mathcal{L}(E_i, F)$ sont continues en un point a de U , alors f est différentiable au point a .

Démonstration.

Nous ferons la démonstration pour $n = 2$. Le cas général se démontre d'une manière similaire. On munit l'espace produit $E = E_1 \times E_2$ de la norme

$$\|(x_1, x_2)\|_\infty = \sup(\|x_1\|, \|x_2\|).$$

Considérons l'application $L : E \rightarrow F$ définie par

$$L(h) = D_1 f(a)(h_1) + D_2 f(a)(h_2) \quad \text{pour tout } h = (h_1, h_2) \in E;$$

c'est une application linéaire continue. On veut montrer que

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} \frac{\|f(x) - f(a) - L(x - a)\|}{\|x - a\|_\infty} = 0.$$

Démonstration.

Puisque U est un ouvert de E contenant le point $a = (a_1, a_2)$, alors il existe $r > 0$ tel que $B(a, r) \subset U$.

Pour tout $x = (x_1, x_2) \in B(a, r)$ on a [Voir note 7](#)

$$\begin{aligned} & f(x) - f(a) - L(x - a) \\ &= f(x) - f(a) - D_1 f(a)(x_1 - a_1) - D_2 f(a)(x_2 - a_2) \\ &= f(x_1, x_2) - f(a_1, x_2) - D_1 f(a)(x_1 - a_1) \\ &\quad + f(a_1, x_2) - f(a_1, a_2) - D_2 f(a)(x_2 - a_2) \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} \|f(x) - f(a) - L(x - a)\| &\leq \|f(x_1, x_2) - f(a_1, x_2) - D_1 f(a)(x_1 - a_1)\| \\ &\quad + \|f(a_1, x_2) - f(a_1, a_2) - D_2 f(a)(x_2 - a_2)\| \end{aligned}$$

Démonstration.

Puisque U est un ouvert de E contenant le point $a = (a_1, a_2)$, alors il existe $r > 0$ tel que $B(a, r) \subset U$.

Pour tout $x = (x_1, x_2) \in B(a, r)$ on a [Voir note 7](#)

$$\begin{aligned} & f(x) - f(a) - L(x - a) \\ &= f(x) - f(a) - D_1 f(a)(x_1 - a_1) - D_2 f(a)(x_2 - a_2) \\ &= f(x_1, x_2) - f(a_1, x_2) - D_1 f(a)(x_1 - a_1) \\ &\quad + f(a_1, x_2) - f(a_1, a_2) - D_2 f(a)(x_2 - a_2) \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} \|f(x) - f(a) - L(x - a)\| &\leq \|f(x_1, x_2) - f(a_1, x_2) - D_1 f(a)(x_1 - a_1)\| \\ &\quad + \|f(a_1, x_2) - f(a_1, a_2) - D_2 f(a)(x_2 - a_2)\| \end{aligned}$$

Démonstration.

Soit $\varepsilon > 0$ donné. Nous allons montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que les inégalités

$$\|x_1 - a_1\| < \eta, \|x_2 - a_2\| < \eta, \quad (*)$$

entraînent

$$\begin{cases} \|f(x_1, x_2) - f(a_1, x_2) - D_1 f(a)(x_1 - a_1)\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \|x_1 - a_1\| \\ \|f(a_1, x_2) - f(a_1, a_2) - D_2 f(a)(x_2 - a_2)\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \|x_2 - a_2\| \end{cases} \quad (**)$$

Démonstration.

L'application $D_1 f$ est continue au point $a = (a_1, a_2)$ (par hypothèse). Alors il existe un $\eta_1 > 0$ (auquel nous pouvons imposer de vérifier $\eta_1 < r$) tel que les inégalités

$$\|x_1 - a_1\| < \eta_1, \|x_2 - a_2\| < \eta_1$$

entraînent

$$\|D_1 f(x_1, x_2) - D_1 f(a_1, a_2)\| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

De même l'application $D_2 f$ est continue au point a (par hypothèse). Alors il existe un $\eta_2 > 0$ (auquel nous pouvons imposer de vérifier $\eta_2 < r$) tel que les inégalités

$$\|x_1 - a_1\| < \eta_2, \|x_2 - a_2\| < \eta_2$$

entraînent

$$\|D_2 f(x_1, x_2) - D_2 f(a_1, a_2)\| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Démonstration.

Posons $\eta = \inf(\eta_1, \eta_2)$.

Donc les inégalités

$$\|x_1 - a_1\| < \eta, \|x_2 - a_2\| < \eta$$

entraînent à la fois les inégalités

$$\begin{cases} \|D_1 f(x_1, x_2) - D_1 f(a_1, a_2)\| \leq \frac{\epsilon}{2} \\ \|D_2 f(x_1, x_2) - D_2 f(a_1, a_2)\| \leq \frac{\epsilon}{2} \end{cases} \quad (***)$$

Fixons $x = (x_1, x_2) \in E$ tel que

$$\|x_1 - a_1\| < \eta, \|x_2 - a_2\| < \eta$$

Démonstration.

Montrons la première inégalité de (**). Considérons l'application

$$\varphi_1 : B(a_1, \eta) \subset E_1 \longrightarrow F, \quad v_1 \mapsto f(v_1, x_2) - D_1 f(a)(v_1)$$

où $B(a_1, \eta)$ est la boule ouverte de centre a_1 et de rayon η dans E_1 .
On veut majorer

$$\|\varphi_1(x_1) - \varphi_1(a_1)\|.$$

L'application φ_1 est différentiable sur $B(a_1, \eta)$ car l'application partielle $v_1 \mapsto f(v_1, x_2)$ est différentiable sur $B(a_1, \eta)$ (puisque $D_1 f$ existe sur U par hypothèse) et $D_1 f(a)$ est une application linéaire continue (donc différentiable). De plus, pour tout $z_1 \in B(a_1, \eta)$ on a

$$D\varphi_1(z_1) = D_1 f(z_1, x_2) - D_1 f(a),$$

Voir note 8

Démonstration.

Donc d'après (***) on a

$$\|D\varphi_1(z_1)\| = \|D_1f(z_1, x_2) - D_1f(a_1, a_2)\| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

En appliquant le théorème des accroissements finis (théorème 17) à l'application φ_1 sur la boule ouverte $B(a_1, \eta)$, on conclut donc que

$$\|\varphi_1(x_1) - \varphi_1(a_1)\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \|x_1 - a_1\|,$$

c'est-à-dire,

$$\|f(x_1, x_2) - f(a_1, x_2) - D_1f(a)(x_1 - a_1)\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \|x_1 - a_1\|.$$

D'où la première inégalité de (**).

Démonstration.

De même façon on montre la deuxième inégalité de (**); Pour cela, considérons l'application

$$\varphi_2 : B(a_2, \eta) \subset E_2 \longrightarrow F, \quad v_2 \mapsto f(a_1, v_2) - D_2f(a)(v_2)$$

où $B(a_2, \eta)$ est la boule ouverte de centre a_2 et de rayon η dans E_2 . On veut majorer

$$\|\varphi_2(x_2) - \varphi_2(a_2)\|.$$

L'application φ_2 est différentiable sur $B(a_2, \eta)$ car l'application partielle $v_2 \mapsto f(a_1, v_2)$ est différentiable sur $B(a_2, \eta)$ (puisque D_2f existe sur U par hypothèse) et $D_2f(a)$ est une application linéaire continue (donc différentiable). De plus, pour tout $z_2 \in B(a_2, \eta)$ on a

$$D\varphi_2(z_2) = D_2f(a_1, z_2) - D_2f(a).$$

Démonstration.

Donc d'après (***) on a

$$\|D\varphi_2(z_2)\| = \|D_2f(a_1, z_2) - D_2f(a_1, a_2)\| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

En appliquant le théorème des accroissements finis (théorème 17) à l'application φ_2 sur la boule ouverte $B(a_2, \eta)$, on conclut donc que

$$\|\varphi_2(x_2) - \varphi_2(a_2)\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \|x_2 - a_2\|,$$

c'est-à-dire,

$$\|f(a_1, x_2) - f(a_1, a_2) - D_2f(a)(x_2 - a_2)\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \|x_2 - a_2\|.$$

D'où la deuxième inégalité de (**). □

Démonstration.

Ainsi les inégalités (*) entraînent les inégalités (**)

C'est-à-dire, les inégalités

$$\|x_1 - a_1\| < \eta, \quad \|x_2 - a_2\| < \eta$$

entraînent les inégalités

$$\begin{cases} \|f(x_1, x_2) - f(a_1, x_2) - D_1 f(a)(x_1 - a_1)\| \leq \frac{\epsilon}{2} \|x_1 - a_1\| \\ \|f(a_1, x_2) - f(a_1, a_2) - D_2 f(a)(x_2 - a_2)\| \leq \frac{\epsilon}{2} \|x_2 - a_2\| \end{cases}$$

Or

$$\begin{aligned} \|f(x) - f(a) - L(x - a)\| &\leq \|f(x_1, x_2) - f(a_1, x_2) - D_1 f(a)(x_1 - a_1)\| \\ &\quad + \|f(a_1, x_2) - f(a_1, a_2) - D_2 f(a)(x_2 - a_2)\| \end{aligned}$$

Démonstration.

Donc

$$\begin{aligned}
 \|f(x) - f(a) - L(x - a)\| &\leq \frac{\varepsilon}{2} \|x_1 - a_1\| + \frac{\varepsilon}{2} \|x_2 - a_2\| \\
 &\leq \frac{\varepsilon}{2} \|x - a\|_\infty + \frac{\varepsilon}{2} \|x - a\|_\infty \\
 &\leq \varepsilon \|x - a\|_\infty.
 \end{aligned}$$

D'où

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} \frac{\|f(x) - f(a) - L(x - a)\|}{\|x - a\|_\infty} = 0.$$

Ceci prouve que f est différentiable au point a , et que sa différentielle en ce point est l'application linéaire L . □

Note 1

Si

$$f'_d(t_0) = \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t > t_0}} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}$$

existe alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall t \in]t_0, t_0 + \delta] \cap [a, b], \quad \left\| \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0} - f'_d(t_0) \right\| \leq \varepsilon$$

Pour $\delta' = \inf(\delta, b - t_0)$ on aura

$$\forall t \in]t_0, t_0 + \delta'], \quad \left\| \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0} - f'_d(t_0) \right\| \leq \varepsilon$$

(car si $t \in]t_0, t_0 + \delta']$ alors $a \leq t_0 < t \leq t_0 + \delta' \leq b$ et $t_0 < t \leq t_0 + \delta' \leq t_0 + \delta$, donc $t \in]t_0, t_0 + \delta] \cap [a, b]$).

Note 2

Si $t \in [u, c[$ alors (par définition de la borne supérieure) il existe $x \in I_\varepsilon$ tel que $t < x$, donc

$$\|f(t) - f(u)\| \leq g(t) - g(u) + \varepsilon(t - u)$$

Donc

$$\|f(t) - f(u)\| \leq g(t) - g(u) + \varepsilon(t - u), \quad \forall t \in [u, c[.$$

L'inégalité précédente est aussi pour $t = c$ (puisque f et g sont continues en c), ce qui prouve que $c \in I_\varepsilon$.

[◀ Retour.](#)

Note 3

On a

$$f'_d(c) = \lim_{\substack{t \rightarrow c \\ t > c}} \frac{f(t) - f(c)}{t - c} \quad \text{et} \quad g'_d(c) = \lim_{\substack{t \rightarrow c \\ t > c}} \frac{g(t) - g(c)}{t - c}$$

Donc pour $\varepsilon > 0$ donné, il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall t \in]c, c + \delta] \cap [a, b], \quad \left\| \frac{f(t) - f(c)}{t - c} - f'_d(c) \right\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

De même, il existe $\eta > 0$ tel que

$$\forall t \in]c, c + \eta] \cap [a, b], \quad \left| \frac{g(t) - g(c)}{t - c} - g'_d(c) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Posons maintenant $h = \inf(\delta, \eta, v - c)$. Alors pour tout $t \in]c, c + h]$ on a

$$\left\| \frac{f(t) - f(c)}{t - c} - f'_d(c) \right\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{et} \quad \left| \frac{g(t) - g(c)}{t - c} - g'_d(c) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Note 4

On a

$$\left\| \frac{f(t) - f(c)}{t - c} - f'_d(c) \right\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

donc

$$\begin{aligned} \left\| \frac{f(t) - f(c)}{t - c} \right\| &= \left\| \frac{f(t) - f(c)}{t - c} - f'_d(c) + f'_d(c) \right\| \\ &\leq \left\| \frac{f(t) - f(c)}{t - c} - f'_d(c) \right\| + \|f'_d(c)\| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \|f'_d(c)\| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + g'_d(c) \end{aligned}$$

et on a

$$\left| \frac{g(t) - g(c)}{t - c} - g'_d(c) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

c'est-à-dire,

$$-\frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{g(t) - g(c)}{t - c} - g'_d(c) \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Donc

$$g'_d(c) \leq \frac{g(t) - g(c)}{t - c} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

ou encore

$$g'_d(c) + \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{g(t) - g(c)}{t - c} + \varepsilon.$$

D'où

$$\left\| \frac{f(t) - f(c)}{t - c} \right\| \leq \|f'_d(c)\| + \frac{\varepsilon}{2} \leq g'_d(c) + \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{g(t) - g(c)}{t - c} + \varepsilon,$$

Note 5

Théorème

Soient a et b deux points de $\mathbb{R}$ tels que $a < b$, F un espace vectoriel normé. Soient $f : [a, b] \rightarrow F$ et $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux applications continues sur $[a, b]$. On suppose que f et g possèdent des **dérivées à gauche** en chaque point x de l'intervalle ouvert $]a, b[$ vérifiant l'inégalité

$$\|f'_g(x)\| \leq g'_g(x), \quad \forall x \in]a, b[.$$

Alors on a

$$\|f(b) - f(a)\| \leq g(b) - g(a).$$

Démonstration.

Il suffit d'appliquer le théorème fondamental aux fonctions

$x \mapsto -f(-x)$ et $x \mapsto -g(-x)$.

En effet, posons $\varphi(x) = -f(-x)$ et $\psi(x) = -g(-x)$ pour tout

$x \in [-b, -a]$

On a

$$\varphi = f \circ h \quad \text{et} \quad \psi = g \circ h$$

où $h : [-b, -a] \rightarrow [a, b]$ est la fonction définie par $h(x) = -x$ pour tout $x \in [-b, -a]$. □

Démonstration.

- Puisque h est continue sur $[-b, -a]$, f et g sont continues sur $[a, b]$, alors φ et ψ sont continues sur $[-b, -a]$.
- La fonction φ est dérivable à droite en chaque point $x_0 \in]-b, -a[$. En effet, on a

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} \frac{-f(-x) + f(-x_0)}{x - x_0}$$

et en posant $t = -x$ et $t_0 = -x_0 \in]a, b[$ on obtient

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t < t_0}} \frac{-f(t) + f(t_0)}{-t + t_0} = \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t < t_0}} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0} \\ &= f'_g(t_0) = f'_g(-x_0). \end{aligned}$$

Démonstration.

Cela montre que φ est dérivable à droite en chaque $x_0 \in]-b, -a[$ et on a

$$\varphi'_d(x_0) = f'_g(-x_0).$$

De même on montre que ψ est dérivable à droite en chaque $x_0 \in]-b, -a[$ et on a

$$\psi'_d(x_0) = g'_g(-x_0).$$

- De plus, on a par hypothèse :

$$\|f'_g(x)\| \leq g'_g(x), \quad \forall x \in]a, b[$$

alors

$$\|\varphi'_d(x_0)\| = \|f'_g(-x_0)\| \leq g'_g(-x_0) = \psi'_d(x_0), \quad \forall x_0 \in]-b, -a[.$$

c'est-à-dire,

$$\|\varphi'_d(x_0)\| \leq \psi'_d(x_0), \quad \forall x_0 \in]-b, -a[.$$

Démonstration.

Donc d'après le théorème fondamental on a

$$\|\varphi(-a) - \varphi(-b)\| \leq \psi(-a) - \psi(-b)$$

c'est-à-dire,

$$\| -f(a) + f(b) \| \leq -g(a) + g(b)$$

ou encore

$$\| f(b) - f(a) \| \leq g(b) - g(a).$$

◀ Retour.

Note 6

La fonction $h : [0, 1] \rightarrow E$ définie par

$$h(t) = a + t(b - a), \quad \forall t \in [0, 1]$$

est continue sur $[0, 1]$ (elle est lipschitzienne de rapport $k = \|b - a\|$ car pour tous $t, t' \in [0, 1]$ on a

$$\|h(t) - h(t')\| = \|(t - t')(b - a)\| = |t - t'| \|b - a\|.)$$

dérivable sur $]0, 1[$ et pour tout $t_0 \in]0, 1[$ on a

$$h'(t_0) = b - a.$$

En effet

$$\lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t \neq t_0}} \frac{h(t) - h(t_0)}{t - t_0} = \lim_{\substack{t \rightarrow t_0 \\ t \neq t_0}} \frac{(t - t_0)(b - a)}{t - t_0} = b - a.$$

Note 7

Soient $a = (a_1, a_2) \in E$, $x = (x_1, x_2) \in E$ et $r > 0$.

Alors :

$x \in B(a, r)$ si et seulement si $\|x - a\|_\infty < r$ si et seulement si

$$\|x_1 - a_1\| < r, \|x_2 - a_2\| < r.$$

Donc

$$B(a, r) = B(a_1, r) \times B(a_2, r).$$

◀ Retour.

Note 8

L'application φ_1 est bien définie sur la boule $B(a_1, \eta)$ car

$$\forall v_1 \in B(a_1, \eta), \quad (v_1, x_2) \in B(a, \eta) \subset U.$$

L'application φ_1 est différentiable sur $B(a_1, \eta)$ comme différence de deux applications différentiables sur $B(a_1, \eta)$:

- l'application partielle $v_1 \mapsto f(v_1, x_2)$ est différentiable en tout

$z_1 \in B(a_1, \eta)$ car $D_1 f(z_1, x_2)$ existe (puisque $D_1 f$ existe sur U **par hypothèse**). Plus précisément, $D_1 f(z_1, x_2)$ est (**par définition**) la différentielle de l'application $v_1 \mapsto f(v_1, x_2)$ au point z_1 .

- l'application $v_1 \mapsto D_1 f(a)(v_1)$ est linéaire continue (de E_1 vers F), donc différentiable sur $B(a_1, \eta)$. Sa différentielle en tout point $z_1 \in B(a_1, \eta)$ est $D_1 f(a)$.

Donc φ_1 est différentiable sur $B(a_1, \eta)$, et pour tout $z_1 \in B(a_1, \eta)$ on a

$$D\varphi_1(z_1) = D_1 f(z_1, x_2) - D_1 f(a).$$